

Prise en charge des personnes malades (SS)

Les personnes atteintes par la drépanocytose doivent impérativement bénéficier d'un suivi régulier dans des centres spécialisés. Seul ce suivi permet de diminuer la fréquence ou de minorer la gravité des complications.

Tous les services d'accueil et d'urgence de ces hôpitaux peuvent recevoir des drépanocytaires 24 h/24.

Pédiatrie

Hôpital Armand-Trousseau
26, avenue du Docteur-Arnold-Netter
75012 Paris
Tél.: 01 44 73 69 09

Hôpital Necker
149-161, rue de Sèvres
75015 Paris
Tél.: 01 44 49 56 09

Hôpital Robert-Debré
Point bleu, niveau -1
48, boulevard Sérurier
75019 Paris
Tél.: 01 40 03 24 22

CHIC
40, avenue de Verdun
94010 Créteil
Tél.: 01 45 17 50 00

Adultes

Hôpital Tenon
4, rue de la Chine
75020 Paris
Tél.: 01 56 01 66 15

Hôpital Henri-Mondor
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
94000 Créteil
Tél.: 01 49 81 24 40

Pédiatrie et adultes

Hôpital Kremlin-Bicêtre
78, rue du Général-Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél.: 01 45 21 32 98



Les associations partenaires

DRÉPANOCYTOSE

Pour connaître les horaires des permanences assurées par ces associations, appelez-nous au :
01 45 82 50 00
ou **01 45 82 50 43 (permanence)**

LCDM
21, avenue de la République
Appartement 30
92320 Châtillon
Tél.: 06 74 08 85 98

OILD
21, rue Godefroy
92800 Puteaux
Tél.: 01 49 01 13 54

SOS GLOBI PARIS
Maison des associations
181, avenue Daumesnil
75012 Paris
Tél.: 06 60 63 48 66

DREPAVIE
5, rue Saint-Benoît
75006 Paris
Tél.: 03 88 61 14 03

APIPD
5, rue de Belzunce
75010 Paris
Tél.: 01 40 10 02 49
Adresse postale :
7 ter, rue Edouard-Vaillant
93400 Saint-Ouen

HÉRÉDITÉ



Comment se rendre au CIDD ?

15/17, rue Charles Bertheau
75013 PARIS
Standard : 01 45 82 50 00
Secrétariat : 01 45 82 50 14

DÉPISTAGE



Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30


MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTÉ
SOUS-DIRECTION DE LA SANTÉ

TOUTE L'INFO au 3975* et sur PARIS.FR
*Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe sauf tarif propre à votre opérateur

CIDD

Centre d'information et de dépistage de la DRÉPANOCYTOSE

DASES - MISSION COMMUNICATION/ADP - NOVEMBRE 2010 - 26.10.D.S.TT.DA



La drépanocytose est une maladie grave, d'origine génétique, transmise par les deux parents. Plus de 300 000 enfants atteints de cette maladie naissent tous les ans dans le monde. En France, on compte 10 000 malades dans l'Hexagone, 2 000 en Martinique et 1 500 en Guadeloupe. 450 enfants malades naissent chaque année, principalement en Île-de-France et dans les Antilles.

Qui est concerné ?

Cette maladie concerne surtout les personnes originaires d'Afrique intertropicale. On la retrouve aussi en Afrique du Nord, aux Antilles, en Grèce, en Italie du Sud, au Proche-Orient, au Brésil, en Inde et en Amérique du Nord.

Chaque personne fabrique son hémoglobine en fonction de l'information contenue dans les gènes qui lui ont été transmis par son père et sa mère. Un individu peut hériter de deux gènes A : il est dit AA et seule l'hémoglobine A est fabriquée. Une personne qui hérite de deux gènes drépanocytaires S ne fabriquera que de l'hémoglobine S : elle est dite SS. Chez un individu qui a hérité d'un gène A et d'un gène drépanocytair S, l'hémoglobine sera un mélange des deux formes d'hémoglobine : il est AS.

Seuls les sujets SS sont malades.*

Les sujets AS sont bien portants mais lorsque les deux parents sont AS, le risque pour eux d'avoir un enfant gravement malade est de un sur quatre, à chaque naissance. Il est donc important de se faire dépister.

*La drépanocytose touche autant les filles que les garçons.


Il est important de distinguer les porteurs sains du trait drépanocytair et les malades drépanocytaires.

La drépanocytose Qu'est-ce que c'est ?

L'hémoglobine est un constituant des globules rouges qui permet le transport de l'oxygène dans le sang. La drépanocytose est due à une anomalie de l'hémoglobine. Les globules rouges peuvent devenir rigides et se bloquer dans les petits vaisseaux sanguins.

Quels sont les signes ?

- anémie (pâleur et fatigue) ;
- ictère (jaunisse) ;
- crises douloureuses qui peuvent être fréquentes et très violentes, souvent provoquées par la fièvre, le froid, la déshydratation, des efforts intenses ou prolongés ;
- sensibilité accrue à certaines infections ;
- lésion inconstante des organes : cerveau, os, rein...



On peut se faire dépister :

- à tout moment ;
- lorsque l'on envisage d'avoir un enfant.

La Mairie de Paris, en collaboration avec l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et les associations de malades, offre désormais un lieu spécifique pour le dépistage de la drépanocytose, l'information sur la maladie et le soutien des familles.

- Vous pensez être concerné ;
- vous envisagez d'avoir des enfants bientôt ou plus tard ;
- vous voulez des informations complémentaires ;
- un membre de votre famille est atteint de la maladie et vous souhaitez en parler avec les associations ou avec un médecin.

venez nous voir...
Nous sommes à votre disposition.

Dépistage gratuit

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun :

- simple prise de sang, sans rendez-vous
- poste infirmier : 01 45 82 50 06

Horaires des prélèvements :

- du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
- le vendredi matin de 9h à 12h

- Consultation médicale sur rendez-vous
- Orientation possible vers une assistante sociale et/ou un réseau de psychologues spécialisés
- Permanence des associations de patients (01 45 82 50 43)